



Etopósido (Etoposide, VP16)

En el Centro Clínico es referido como VP 16

Cómo se Administra:

Intravenosamente (por vena) y oralmente (por la boca)

Mecanismo de Acción del Fármaco:

El VP16 evita que las células del cáncer se dividan mediante el rompimiento del ADN. El ADN es el material genético de las células utilizado para formar nuevas células.

Efectos Secundarios:

1. Los efectos sobre la médula ósea pueden incluir una disminución temporal de glóbulos blancos, plaquetas y glóbulos rojos. Los glóbulos blancos y las plaquetas por lo general disminuyen 7 a 14 días después del tratamiento y se recuperan en un plazo de 20 días.
2. La náusea y el vómito leves pueden ocurrir.
3. Úlceras en los labios, garganta y la boca pueden presentarse.
4. Puede ocurrir escases temporal del cabello o pérdida temporal del cabello.
5. Pueden ocurrir reacciones alérgicas pero son poco comunes.

Instrucciones Especialies:

1. Dígale a su enfermera inmediatamente si tiene cambios en su respiración, se siente mareado(a) o presenta enrojecimiento facial durante la administración del fármaco (medicamento).
2. No tome aspirina o productos que contienen aspirina a menos que sean recetados por su médico del NIH.

3. Llame a su médico o enfermera del NIH si usted:

- tiene dolor, molestia o enrojecimiento en el sitio de la inyección después del tratamiento
- no puede tomar líquidos por más de 1 día o no puede comer por más de 2 días después del tratamiento
- tiene una temperatura de 101.0° F (38.3° C) en cualquier momento o tiene una temperatura de por lo menos 100.4° F (38.0° C) que dure 1 hora o que ocurra dos veces en un periodo de veinticuatro horas
- tiene algún sangrado o moretón, hematoma fuera de lo común.



Esta información es preparada específicamente para pacientes que participan en la investigación clínica en el Centro Clínico Warren Grant Magnuson de los Institutos Nacionales de Salud y no es necesariamente aplicable a individuos que son pacientes en otra parte. Si tiene preguntas acerca de la información que se presenta aquí, hable con un integrante de su equipo de atención médica.

Series Viviendo con Quimioterapia para el
Cáncer Borrador/Septiembre de 1998
Institutos Nacionales de Salud, CC
Departamento de Enfermería